

## Aturan Menggunakan ABATE\*1.1G

## ABATE\*1.1G 殺蚊子子劑 的用法

PEROSAK 害蟲	TEMPAT / KEADAAN 地方 / 位置	KADAR RACUN / 用藥量		CARA PENGGUNAAN 用法
		10 m <sup>2</sup>	SEHEKTAR 每公頃	
Jejentik 子子 ( <i>Aedes</i> sp.)	Kawasan takungan air cetek seperti kolam air, parit-parit dan becak. 不流動的水(死水), 如水池、水溝、泥沼積水處。	5 g / 克	5 kg / 公升	Tabur ABATE* 1.1G dengan rata dan ulangkan penggunaannya 2-3 bulan sekali jika perlu. 在蚊子繁殖的地方, 每間隔 2-3 個月施用 ABATE*1.1G 一次。
	Bekas pengisi air, tangki air, penjerat semut dan pasu bunga. 貯水缸, 陶瓷貯水用具及花瓶等等。	2 g/18 liter air (bersamaan 1 tin minyak tanah) 用 2 克 ABATE*1.1G 於 18 公升水。	-	

## Aturan Menggunakan ABATE\* 500E

## 施用 ABATE\* 500E 的說明

TEMPAT / KEADAAN 地方 / 位置	PEROSAK 害蟲	KADAR RACUN / 用藥量		ISIPADU SEMBURAN SEHEKTAR 每公頃 噴液量
		10 LITER AIR 10 公升水	SEHEKTAR 每公頃	
Tasik, kolam, longkang, parit, atau tempat pembiakan nyamuk. 湖, 水池, 溝渠, 水溝及蚊子繁殖的地方。	Jejentik 子子 ( <i>Culex</i> sp. <i>Aedes</i> sp. <i>Anopheles</i> sp.)	12 ml / 毫升	120 ml / 毫升	100 liter / 公升

ABATE\* 500E juga boleh disemburkan dengan alat-alat penyembur lain seperti penyembur kabus (mist blower) supaya dapat meliputi tempat yang tersembunyi.

ABATE\* 500E 亦可採用其他噴射器來噴射, 如噴霧器, 使噴射液深入黑斑蚊幼蟲的隱身之處。