

vectobac®-12 AS

RACUN SERANGGA

杀虫剂

PEKATAN (SC)

No. Pendaftaran: LRMP. R1/3983

Kandungan Bersih: 10 liter



Tarikh Mengilang:

Bahan Aktif: Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H-14 1,200 I.T.U. / mg



Didaftarkan oleh:
HALEX (M) SDN. BHD. (47751-V)
9, Jalan Taruka, Tampoi Industrial Estate,
81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia.
Tel: 07-2371543, 2373309 Faks: 07-2370276

® Registered Trademark of
Valent BioSciences

JAUHKAN DARIPADA
MAKANAN DAN
KANAK-KANAK

KELAS IV

勿贮藏在靠近
食品或儿童
所接触的地方

ATURAN MENGGUNAKANNYA 用法说明:

Untuk kawalan jejentik nyamuk seperti *Aedes* sp. gunakan Vectobac - 12AS seperti berikut:-

以 Vectobac - 12AS 来控制孑孓的方法如下:-

Habitat 孑孓栖息地	Kadar 用药量
1. Saluran pengairan parit, parit tepi jalan, kawasan banjir, kolam, kawasan tadahan air, lembah dan kawasan tanaman padi. 排水管、路边排水渠、泛滥区、池塘、积水区、河谷及水稻田。	0.3 - 1.5 liter / hektar 每公顷用 0.3 - 1.5 公升
2. Kawasan air cemar dan kawasan 'sewage'. 污水处理区、粪池。	1.5 - 3 liter / hektar 每公顷用 1.5 - 3 公升

Gunakan kadar yang tinggi jika populasi jejentik nyamuk tinggi, bila instar 3 dan 4 jejentik terbentuk, air menjadi cemar atau terdapat banyak algae.

当孑孓在第三或第四次脱壳成蛹的时候，可用多量的 Vectobac - 12AS 撒入水面并呈藻状，这能有效地控制蚊虫的猖獗滋生。

Panduan Membancuh:

Disyorkan menggunakan alat penyembur galas. Isikan tangki setengah penuh dengan air bersih. Campurkan Vectobac-12AS secukupnya mengikut syor yang ditetapkan dalam jadual sukatan dan bancuh. Seterusnya tambah baki air bersih yang diperlukan & kacau. Jangan guna pada kadar yang lebih tinggi dari yang disyorkan.

Panduan Menyembur:

Lakukan semburan apabila jentik-jentik nyamuk kelihatan. Sembur apabila perlu sahaja. Perlu gunakan Vectobac-12AS berselang seli dengan racun serangga lain yang mempunyai cara tindakan yang berbeza.

Tempoh Dilarang Masuk Semula Kawasan Rawatan (REI) : 12 jam.

AWAS: Berbahaya jika terminum. Elakkan daripada terhidu wasap atau kabus semburan. Elakkan daripada terkena pada kulit atau mata. Pakai pakaian pelindung diri termasuk sarung tangan, dan JANGAN makan, minum atau merokok ketika mengendalikan produk ini. Basuh badan sebersih-bersihnya dengan sabun dan air selepas mengendalikan racun ini. Tutup bekas dengan rapat dan simpan di tempat berkunci yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan dingin. Cuci alat penyembur sebersih-bersihnya selepas menggunakananya.

TANDA TERKENA RACUN: Gatal-gatal pada kulit dan mata.

RAWATAN KECEMASAN: Tanggalkan pakaian yang terkena racun. Jika terkena pada kulit, basuh dengan menggunakan sabun dan air. Jika terkena pada mata, bersihkan dengan menggunakan air bersih yang banyak. Jika tertelan, ikhtiarkan supaya pesakit itu muntah dengan menjolok jari ke dalam kerongkong selepas diberi minum air. Jangan beri apa-apa melalui mulut dan jangan ikhtiarkan pesakit itu muntah jika dia tidak sedar. Dapatkan rawatan perubatan dengan segera.

RAWATAN PERUBATAN: Rawatan hendaklah mengikut tanda sakit.

PENYIMPANAN DAN PEMBUANGAN: Simpan di bawah suhu 40° C dan di tempat yang kering.

MEDICAL TREATMENT: Treatment is symptomatic.

JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN. TANAM BEKAS RACUN APABILA KOSONG.

DO NOT USE EMPTY PESTICIDE CONTAINER TO STORE FOODSTUFF. BURY PESTICIDE CONTAINER WHEN EMPTY.

切勿使用此药剂的空罐贮藏食物，须将药剂空罐掩埋之。

KEEP AWAY
FROM FOODSTUFF
AND CHILDREN

KELAS IV

உணவுகள் மற்றும்
குழந்தைகளுக்கு
அருசில் வைக்காது